BarFertile SPRING&AUTUMN

N-P-K 16-5-8+Mg+Fe

- Origine esclusivamente vegetale
- Specifico per la nutrizione primaverile e autunnale del tappeto erboso
- Rapporto N : K ideale per sostenere le fasi di maggior crescita del tappeto erboso

Barfertile Spring&Autumn è un innovativo concime organo-minerale specifico per la nutrizione primaverile e autunnale del tappeto erboso, contenente sostanza organica di origine esclusivamente vegetale.

BarFertile, il meglio di due mondi
I concimi BarFertile combinano in maniera ottimale i vantaggi dei concimi organici con quelli dei concimi minerali: non contengono azoto nitrico, che aumenta il volume della cellula vegetale favorendo la crescita verticale del prato, e garantiscono la disponibilità equilibrata dell'azoto per circa 3 mesi grazie al 35% di sostanza organica di origine vegetale ed all'azoto a lento rilascio (metilenurea a catena media).

Titolo equilibrato, con magnesio, zolfo e ferro
Barfertile Spring&Autumn ha un rapporto N : K ideale per le sostenere le fasi di maggior crescita del tappeto erboso (primavera e fine estate), evitando tuttavia l'eccessiva spinta vegetativa. Contiene magnesio, zolfo e ferro che migliorano la colorazione del prato.
La provenienza esclusivamente vegetale della sostanza organica, evita l'emissione di odori sgradevoli.

Composizione
CONCIME ORGANO MINERALE NPK (Mg – S) 16-5-8 (2-13) con Ferro (Fe)
16% Azoto (N) totale
1,3% Azoto (N) organico
5,7% Azoto (N) ammoniacale
5 % Azoto (N) ureico
4 % Azoto (N) da metilenurea a catena media
5% Anidride fosforica (P_2O_5) totale
4,6 % Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro ed acqua
4,3 % Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua
8% Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua
2% Ossido di magnesio (MgO) totale

BARENBRUG

Barenbrug Italia S.r.l. • Via Vittorio Veneto, 22 • 20852 Villasanta (MB) • Italia • www.barenbrug.it

13% Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua
1% Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) organico di origine biologica: 12%
Granulometria: 1-3 mm

Modalità d'impiego

- · **Tappeti erbosi**: 30-40 g/mq primavera e fine estate
- · **Siepi e arbusti**: 50-70 g/pianta
- · **Alberi e fruttiferi**: 80-150 g/pianta
- · **Rosai**: 50-60 g/mq, primavera e autunno
- · **Annuali**: 40-50 g/mq primavera e estate